

Vejledning – Helicobacter pylori antigen

Før prøvetagning:

Du må ikke være i behandling med antibiotika, fx Penicillin de sidste **4 uger før undersøgelsen**. Du må heller ikke have været i behandling med syrehæmmende medicin/protonpumpehæmmere de sidste **2 uger før undersøgelsen, dvs. stop indtagelsen af Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Pariet og Nexium**. I stedet kan du anvende syreneutraliserende midler (Novaluzid, Balancid, Alminox og lignende).

Er du i tvivl? Kontakt din egen læge.

Hvis ikke du har fået udleveret en EasySampler af din praktiserende læge, kan du bruge toiletpapir til at holde afføringen over vandet i toiletten.


Brug **podepinden** fra fecalSwab'en til at fylde **afføring i røret** på fecalSwab'en – mængden skal svare til en grønært.

Trin 1




Slå toiletsædet op.
Tør kanten af toiletkummen af.

Trin 2




Fold EasySampler ud.

Trin 3



Fjern tapebeskyttelsen på de bagerste flapper og montér bagerst på kummen.

Trin 4



Fjern tapebeskyttelsen på de forreste flapper og montér forrest på kummen.

Trin 5



Det er vigtigt, at EasySampler monteres så den danner en lille pose.
EasySampler må ikke berøre vandet.
Slå toiletsædet ned og EasySampler er klar til brug.

Trin 6



Brug **podepinden** fra fecalSwab'en til at fylde **afføring i røret** på fecalSwab'en – mængden skal svare til en grønært.
Løsn EasySampler og skyl den ud.

Trin 7



Brug stort skyl. Der bør trækkes ud 2-3 gange svarende til ca. 10-15 L vand.

Efter aftale med din læge, afleveres prøven til lægen, eller indsendes i det af lægen udleverede materiale.

Prøvesvar fås efter aftale hos egen læge.